



HYGIJNE FOR FODTERAPEUTER
Akkreditering - standard nr. 5

Version 01 - oktober 2018



Smittefarlige patienter

SMITTEFARLIGE PATIENTER

Det er vigtigt, at patienter der måtte være bærer af eks. MRSA eller andre smitsomme lidelser, ikke oplever at blive stigmatiseret i klinikken. Patienter der kommer til undersøgelse og behandling i klinikken, udspørges ikke om deres MRSA risikosituation jf. Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA".

De smittefarlige patienter, som klinikken har kendskab til, bliver af praktiske grunde lagt sidst i dagsprogrammet. Dette forebygger at de møder andre patienter i venteværelset, og i bedste fald kan komme direkte ind i behandlingsstolen uden at få kontakt med inventar i venteværelset. Hjemmebehandling af smittefarlig patient, besøges ligeledes af praktiske grunde som den sidste i dagsprogrammet.

Alle patienter, uanset smittestatus, har ret til at modtage de samme typer undersøgelser og behandlinger. Ofte har patienten eller klinikken ikke kendskab til smittebærerstatus, og derfor skal klinikken altid nøje følge generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Håndhygiejne er den vigtigste foranstaltning til at mindske smittespredning.

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED UNDER-SØGELSE OG BEHANDLING I KLINIKKEN OG VED HJEMMEBEHANDLING AF SMITTEFARLIGE PATIENTER

Patienten behandles sidst på dagen, så der ikke er andre patienter efter vedkommende

Der udføres korrekt håndhygiejne:

- før og efter kontakt
- før rene opgaver
- efter urene opgaver
- efter brug/skift af handsker (og andre værnemidler)

ENGANGSHANDSKER

- Der anvendes engangshandsker ved al direkte kontakt med patienten, instrumenter, udstyr og inventar som har været i kontakt med patienten, samt affald fra undersøgelsen/behandlingen

ENGANGSKITLER ELLER PLASTFORKLÆDE

- Væskeafvisende engangskittel, der dækker arbejdsdragten, kan anvendes i klinikken men skal anvendes i hjemmet, hvis der er risiko for at komme i direkte kontakt med patienten, instrumenter, udstyr, snavsetøj eller inventar eller ved kontakt til affald fra undersøgelse og behandling. Ærmer skal slutte tæt ved håndleddene.
- Hvis ikke der anvendes engangskittel i klinikken, anvendes der plastforklæde ved risiko for forurening med blod eller andet biologisk materiale. Hvis der er støvdannelse under behandlingen, er engangskittel at foretrække, da den dækker hele uniformen og dermed forebygger, at den forurenes.

ENGANGSMASKE

- Kirurgisk maske kan anvendes ved kontakt med patient med luftvejsinfektion med MRSA.

- Kirurgisk maske kan anvendes ved eks. skift af forbindelse.
- Undersøgelsen og behandlingen planlægges, så nødvendigt udstyr og materialer er taget frem. Behandlingsudstyret skal så vidt muligt være af en type der kan tåle at gå igennem de tre trin. Alternativt anvendes engangsudstyr.
- Affald pakkes og bortskaffes som vanlig dagrenovation, medmindre det er klinisk risikoaffald.

Spørgsmål du bør tænke over:

- Hvordan sikrer klinikken at patienten ikke føler sig udstillet og fremmedgjort?
- Skal der være ekstra opmærksomhed på de 6 fokusområder, i forhold til rengøringen, eller skal rengøringen efter alle patienter altid foretages med fokus på disse 6 områder?

RENGØRING

Efter undersøgelsen og behandlingen, udføres der rengøring. I hjemmet er patienten blevet instrueret i dette af hjemmeplejen eller sygehuset. I klinikken skal der udføres rengøring, der følger de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, der indebærer:

- Kontaktpunkter (eks. håndtag, behandlingsstolsoverflade, stolesæde, armlæn), som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres herefter med egnet desinfektionsmiddel.
- Vandrette flader, som kan være kontamineret via stænk, sprøjt eller berøring af patient eller personale, rengøres med almindelige rengøringsmidler.
- Spild af blod og andet biologisk materiale skal straks tørres op, så al synlig forurening fjernes; brug handsker.
- Efter optørring af større mængder blod eller andre væsvæsker (dvs. spild, der ikke kan fjernes i en arbejdsgang), skal stedet aftørres med egnet desinfektionsmiddel.
- Overflader som vægge og gulve indgår sjældent i transmission af infektionssygdomme, og sædvanligvis vil der ikke være behov for desinfektion af disse overflader, med mindre der har været synligt spild.
- Vær opmærksom på områder i venteværelset.